

داخلی - جراحی

۱- در مراقبت از بیمار دچار خشکی دهان متعاقب رادیوتراپی خارجی کدام مورد صحیح می باشد؟

- الف) دهانشویه با محلول پراکسید هیدروژن ده درصد
- ب) مزه مزه کردن مرتب آب در دهان
- ج) دهانشویه قبل و بعد از مصرف غذا
- د) دهانشویه با محلول دیفن هیدرامین

۲- سطح سرمی کدامیک از آنزیم‌های زیر بطور اختصاصی در انفارکتوس میوکارد افزایش می‌یابد؟

- الف) کراتین کیناز
- ب) تروپونین
- ج) میوگلوبین
- د) ال دی اچ

۳- کدامیک از تغییرات بافتی زیر در عضله قلب که ناشی از اختلال خونرسانی است، معمولاً برگشت‌پذیر می‌باشد؟

- الف) ایسکمی
- ب) آسیب
- ج) نکروز
- د) انفارکتوس

۴- تفسیر شما به عنوان یک پرستار هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان با دیسپنه شدید و ویزینگ با سطح گازهای خون شربانی $HCO_3=24$, $Pao_2=65$ mmHg, $Paco_2=55$ mmHg, $PH=7.24$ از نتایج آزمایش چیست؟

- الف) اسیدوز متابولیک
- ب) آکالالوز متابولیک
- ج) اسیدوز تنفسی
- د) آکالالوز تنفسی

۵- برای پیشگیری از آسپیراسیون در بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری، پرستار کدامیک از اقدامات زیر را در برنامه مراقبتی مورد توجه قرار می‌دهد؟

- الف) بالا نگه داشتن سر تخت به میزان ۳۰ درجه

تخصصی ترین مرکز مشاوره، برنامه

۶- در بیماران تحت عمل جراحی کرانیوتومی که تحت درمان گستردگی با کورتیکواستروئیدها قرار می‌گیرد، پرستار کدامیک از اختلالات زیر را بررسی و در برنامه مراقبتی خود مورد توجه قرار می‌دهد؟

- الف) هایپوناترمی
- ب) هایپرکلسی
- ج) هایپرگلیسمی
- د) هایپومنیزیمی

۷- در بررسی بیمار کمایی، پرستار کدامیک از مکانیسم‌های بررسی و ارزیابی در بیمار را در اولویت قرار می‌دهد؟

- الف) اعصاب جمجمه‌ای، سطح هوشیاری
- ب) سیستم حرکتی، اعصاب جمجمه‌ای
- ج) رفلکس‌ها، اعصاب جمجمه‌ای
- د) سطح هوشیاری، رفلکس‌ها

۸- به عنوان یک پرستار دستورالعمل تقذیه‌ای بیماران تحت عمل جراحی یورتروسیگموئیدوستومی (Uretero Sigmoidostomy) کدام موارد زیر را مدنظر قرار می‌دهید؟

- الف) تشویق به جویند آدامس
- ب) دریافت نمک به میزان لازم
- ج) افزایش دریافت پتاسیم
- د) مواد تغذیه‌ای گازدار

۹- در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته‌اند و داروی سیکلوسپورین مصرف می‌کنند، پرستار کدامیک از علائم زیر را به عنوان علامت پس زدن حاد پیوند کلیه گزارش می‌نماید؟

- الف) افزایش فشارخون
- ب) الیگوری
- ج) افزایش وزن
- د) افزایش بدون نشانه کراتینین سرم

۱۰ - پرستار در بیمار مبتلا به بیماری انتهایی کلیوی که دسترسی عروق برای وی فراهم شده است، کدامیک از نکات مراقبتی زیر را مدنظر قرار می‌دهد؟

- الف) پرستار از اندام دارای دسترسی عروقی، مجاز است فشارخون بیمار را کنترل نماید.
- ب) پرستار در طول هر شیفت کاری باید وجود بروئیت تریل (Thrill Bruit) را تأیید کند.
- ج) بیمار مجاز است در اندام دارای دسترسی عروق، زیورآلات خود را آویزان نماید.
- د) پرستار امکان نمونه‌گیری خون از اندام دارای دسترسی عروق را فراهم نماید.

۱۱ - پرستار در ضمن بازدید از مدرسه متوجه دانش آموز منزوی، با عملکرد درسی ضعیف توأم با بوی متعفن در مجرای گوش، می‌شود. احتمال وجود کدام التهاب گوش وجود دارد؟

- الف) گوش میانی و داخلی
- ب) گوش داخلی
- ج) گوش میانی
- د) گوش خارجی

۱۲ - پرستار استفاده از عینک آفتابی را برای کاهش ناراحتی بیماران مبتلا به توصیه می‌نماید.

- الف) یووئیت
- ب) کوئرکتیویت
- ج) بلفاریت
- د) گولوکوم

۱۳ - پرستار در حال مراقبت از بیماری با ریتم VT همراه با نبض در بخش اورژانس قلب است. برای بیمار لیدوکائین شروع شده است. در صورت بروز کدامیک از تظاهرات بالینی زیر دارو قطع و به پزشک بیمار اطلاع داده می‌شود؟

- الف) تاکیکاردنی
- ب) گیجی و لتارژی
- ج) سرفه‌های مکرر
- د) طولانی شدن فاصله QT

۱۴ - بیماری به دنبال شکستگی در ناحیه پا در بخش بستره شده است. با مشاهده چه علائمی در بیمار، احتمال سندروم کمپارتمان مطرح می‌شود؟


- الف) درد عمیق، ضربان دار، بی وقفه
- ب) پوست صورتی رنگ، کاهش یا عدم وجود نبض
- ج) کاهش مدت زمان پرشدگی مجدد مویرگی
- د) پوست گرم، عدم مشکل در تکان دادن انگشتان پا

۱۵ - بعد از عمل کرانیوسرجری، تشخیص پرستاری «خطر پروفیوژن ناموثر بافت مغزی در ارتباط با ادم مغزی» مطرح می‌باشد، اقدام پرستاری مناسب کدام است؟



- الف) خم کردن گردن بیمار
- ب) پایین آوردن سر تخت بیمار
- ج) تغییر پوزیشن مکرر بیمار
- د) اجتناب از خم شدن شدید ران

۱۶ - کدامیک از اقدامات پرستاری زیر در بیمار مبتلا به هایپر تیروئیدیسم مناسب است؟



- الف) تشویق بیمار به مصرف غذاهای پُر کالری و پُر پروتئین
- ب) فراهم کردن محیط گرم و دادن مایعات گرم به بیمار
- ج) وزن روزانه بیمار و تشویق بیمار به فعالیت زیاد
- د) اضافه کردن لباس‌ها و استفاده از حمام اسنجی

۱۷ - کدامیک از شاخص‌های زیر، می‌تواند یکی از معیارهای ضرورت استفاده از ونتیلاتور باشد؟

- الف) Vital Capacity = 10 ml/kg

- ب) PH=7.45

- ج) Paco₂>50 mmHg

- د) Pao₂>60 mmHg

۱۸ - از نقطه نظر بررسی پرستاری، بیماری که «دچار اختلال سطح هوشیاری است به گونه‌ای که از نظر حرکتی و کلامی واکنشی ندارد و از نظر چشمی به درد پاسخ می‌دهد» چه امتیازی کسب می‌کند؟

- الف) ۶
- ب) ۵
- ج) ۴
- د) ۳

۱۹ - اساسی‌ترین علایم کتو اسیدوز دیابتی کدام است؟

- الف) هیپرگلیسمی، اسیدوز
- ب) هیپوگلیسمی، اسیدوز
- ج) دهیدراتاسیون، هیپرناترمی
- د) اختلال الکتروولیتی، مشکل هوشیاری

۲۰ - در کدامیک از اختلالات زیر، ناخن قاشقی شکل (Spoon Shape) مشاهده می‌شود؟

- الف) کمبود جدی آهن سرم
- ب) کمبود کلسیم سرم
- ج) هیپوکسی مزمن
- د) ضربه فیزیکی به ناخن

۲۱ - کدامیک از انواع کمبود اکسیژن (Hypoxia)، ناشی از کاهش بازده قلبی می‌باشد؟

- | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|
| Histotoxic | Circulatory | Anemic | Hypoxicemic |
| الف) | ب) | ج) | الف) |

۲۲ - در کدامیک از مبتلایان به اختلالات زیر، دوره‌های خاموشی (Remission) و تشدید سیمپтом‌ها (Exacerbation) قابل انتظار است؟

- | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| د) | ج) | ب) | الف) |
| اختلال خونی | اختلال عروق کرونر | دیابت نوع دوم | دیابت انتظار |

۲۳ - در کدامیک از درجات سوختگی، نکروز عمیق بافت صورت می‌گیرد؟

- | | | | |
|------|-----|----|------|
| د) | ج) | ب) | الف) |
| چهار | تسه | دو | یک |

۲۴ - کدامیک از مقادیر مربوط با شاخص توده‌ی بدنی (BMI)، در طبقه بندی چاقی درجه دو (Class 2) قرار می‌گیرد؟

- | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| د) | ج) | ب) | الف) |
| بیشتر از 40 | 30-34.9 | 35-39.9 | 25-29.9 |

ریزی و تضمین قبولی کارشناسی

کودکان

۲۵ - کدام نظریه برداز اعتقاد دارد که در نوجوانی، جنبه‌هایی از استدلال اخلاقی متعارف و اصولی وجود دارد و در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- | | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| د) | ج) | ب) | الف) |
| فروید | پیازه | اریکسون | کوهلبرگ |

۲۶ - به منظور ساکشن ترشحات تراشه کودک دو ساله، پرستار فشار دستگاه ساکشن را روی چه محدوده‌ای باید تنظیم کند؟

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| د) | ج) | ب) | الف) |
| 40-60 cmH ₂ O | 40-60 mmHg | 60-100 cmH ₂ O | 60-100 mmHg |

۲۷ - کودکی ۱۱ ماهه در حین بازی دچار چوکینگ شده است، اولین اقدام کدام است؟

- الف) انجام عملیات احیاء در کمتر از ۳۰ ثانیه اول

- ب) وارد نمودن ۵ ضربه بین دو کتف کودک

- ج) ایجاد ۵ ماساژ قلبی ۲ انگشتی در زیر جناق کودک

- د) تلاش برای خارج نمودن جسم توسط انگشت

۲۸ - پرستار در آموزش به مادر کودکی که روز گذشته ۳۰ سی‌سی پک سل شسته شده دریافت کرده، در مورد واکسیناسیون MMR کودکش کدام نکته را باید مورد تاکید قرار دهد؟

- الف) واکسیناسیون سر موعد انجام شود.

- ب) واکسیناسیون حداقل سه ماه بعد انجام شود.


- ج) در این شرایط، واکسیناسیون مجاز نیست.

- د) حداقل یک سال بعد، واکسیناسیون انجام شود.

- ۲۹ - کدام تشخیص پرستاری در مراقبت از کودک مبتلا به لوسومی دارای اولویت بالا است؟
- خطر عفونت مربوط به تضعیف سیستم ایمنی بدن
 - خطر تغذیه نامتعادل کمتر از نیاز بدن
 - غم و اندوه خانواده در ارتباط با احتمال از دست دادن کودک
 - اختلال در تصویر ذهنی از بدن

- ۳۰ - برای پیشگیری از آسپیراسیون در کودکی که در حالت کمای عمیق است، کدام پوزیشن مناسب‌تر می‌باشد؟
- سر و بدن هر دو بر روی یک پهلو
 - به پشت خوابیده و سر بدون بالش
 - دمرو سر پایین‌تر از بدن
 - دمرو سر به یک سمت بر روی بالش

- ۳۱ - کدام گزینه، از علایم اختلالات شنوایی در شیرخواران است؟



- تشخیص منبع صدا در سن ۶ ماهگی

- ثبات پلک به دنبال صدای بلند

- عدم هماهنگی حرکات سر با منبع صدا

- بیدار شدن از خواب در صدای های بلند محیطی

- ۳۲ - اقدام صحیح پرستار در مواجهه با کودک **دچار لکنت زبان کدام است؟**

- به او بگویید: صبر کن و دوباره جمله‌ات را از اول بگو

دستیاری‌ترین مرکز مشاوره، برنامه

- خودش کلمه‌ای را که کودک مشکل دارد بیان کند

- برای درست ادا کردن کلمات برایش جایزه تعیین کند

دستیاری‌ترین قبولی کارشناسی

- سکوت نماید و با کودک تماس چشمی برقرار کند


- ۳۳ - پرستار در آموزش به نوجوانی که داروهای ضد تشنج مصرف می‌کند، کدام مورد را باید تاکید کند؟

- صرف مکمل ویتامین D و اسید فولیک

- صرف شیر همزنان با فنی تؤیین



- قطع مصرف دارو در صورت قطع حملات تشنجی



- احتمال بروز اختلال شخصیت به دلیل مصرف داروهای

- ۳۴ - اندازه‌گیری فشار خون از چهار دست و پای کودکان، به شناسایی کدام بیماری قلبی مادرزادی کمک می‌کند؟

- کوارکتاسیون آثرت
- تنگی آثرت
- جباجایی عروق بزرگ
- تترالوژی فالوت

- ۳۵ - کدام یک از گزینه‌های زیر را جهت آموزش تغذیه کودک مبتلا به اسهال انتخاب می‌کنید؟

Moshaveranetahsili

- رزیم غذایی BRAT (موز، برنج، آب سیب و چای)

- صرف مایعات زیاد حاوی آب میوه‌جات، ژله، چای و قهوه

- گوشت و جوجه به صورت کبابی همراه با برنج کته و نوشابه

- گوشت مرغ پخته شده همراه با برنج کته، سبزیجات پخته و غلات

- ۳۶ - کدام گزینه، از اثرات عملکرد مختلط غدد اگزوکرین در بیماری فیبروز کیستیک می‌باشد؟

- هیپرتانسیون پورتال
- دفع مکونیوم جنینی
- ابی گلوتیت مکرر
- تعريق

- ۳۷ - کودکی ۱۰ ساله دچار کتواسیدوز دیابتی به بخش اورژانس آورده شده است. در بررسی اولیه بیمار، وجود کدام یک از حالات‌های زیر مورد انتظار است؟

- وجود تنفس‌های سطحی و تندر، افزایش فشار خون و تاکیکاری

- کاهش سطح هوشیاری و تنفس‌های با بوی علف تازه

- سردرد، گرسنگی و بی‌قراری شدید

- میزان ادرار کافی و همراه با میزان کم کتون در ادرار

۳۸ - پرستار موقع مصاحبه با نوجوان بیمار، باید کدام موارد را در نظر داشته باشد؟

- الف) برای اطمینان از صحت اطلاعات، با نوجوان و والدین وی، هم‌مان مصاحبه کند.
- ب) با در نظر داشتن تجرب خود، تظاهر به درک بیمار کند.
- ج) ابتدا با موضوعات حساس شروع کرده و سپس موضوعات معمولی را مطرح کند.
- د) سوالات باز پاسخ از نوجوان بپرسد.

۳۹ - اولویت اصلی مراقبت پرستاری در کودک مشکوک به منزهیت باکتریال چیست؟

- الف) بلند کردن سر و قرار دادن در پوزیشن نشسته

- ب) افزایش حرکات محیطی برای هوشیار نگه داشتن کودک

- ج) ایزوله تنفسی حداقل ۲۴ ساعت بعد از شروع آنتی‌بیوتیک‌تراپی

- د) منع مصرف استامینوفن یا بروفن برای ارزیابی سطح هوشیاری

۴۰ - مطابق با نظریه پیازه کدام به «آگاهی کودک از بقای شیء» حتی اگر در محدوده دید نباشد اشاره دارد؟

- الف) تفکر منطقی
- ب) تداوم شیء
- ج) برگشت‌پذیری شیء
- د) خود محور بودن

۴۱ - دختر ۱۵ ساله‌ای با تشخیص قبلی بی‌اشتهاای عصبی در بخش اورژانس بستری می‌باشد. در ۲۴ ساعت گذشته دفع

ادراری نداشته است و بی‌حال، رنگ پریده و فقط به تحریک دردناک پاسخ می‌دهد. کدامیک از تغییرات در آزمایش

مشاوران تحصیلی

- الف) سطح سدیم سرم ۱۴۹ میلی‌اکی‌والان یا کمتر

تینکری گرم‌صی ترین مرکز مشاوره، برنامه

- ب) سطح هموگلوبین ۶/۸ میلی‌گرم

- ج) PH خون شریانی معادل ۷/۳۰

ریزکری تضمین قبولی کارشناسی

- د) نیاز به مداخله سریع دارد؟

۴۲ - مهمترین مهارت‌های برقراری ارتباط با نوجوانان کدام است؟

- الف) لبخند زدن
- ب) تماس چشمی
- ج) نواش کردن
- د) شنونده بودن

۴۳ - مهمترین علتی که کودکان در سالین مدرسه را مستعد صدمات احتمالی می‌سازد، کدام است؟

- الف) تلاش برای پذیرفته شدن در گروه همسالان

- ب) فشار همسالان و انجام رفتارهای مخاطره‌آمیز

- ج) عدم انجام نظارت کافی از سوی والدین

- د) بی‌دست و پایی و رفتارهای ناشیانه کودک

۴۴ - مادری شاکی است که کودک نوپای او اغلب اسباب بازی‌های خود را خراب می‌کند، علت این مشکل کدام است؟

- الف) طبیعی است و ناشی از خلق و خوی منفی‌گرای در این سنین است.

- ب) غیر طبیعی است و ناشی از میل به لجبازی در این سنین است.

- ج) غیر طبیعی است و ناشی از رقابت با خواهر، برادر و یا والدین است.

- د) طبیعی است و شیوه آنها در یادگیری دنیای پیرامون خود است.

۴۵ - مادر یک شیرخوار چهار ماهه به دلیل یبوست، مصرف شیر خشک غنی شده با آهن را قطع و به او عسل می‌دهد.

شیرخوار در معرض بروز کدام مشکل است؟

- الف) چاقی و کم‌خونی فقر آهن

- ب) راشیتیسم و کم‌خونی فقر آهن

- ج) بوتولیسم و کم‌خونی فقر آهن

- د) آلرژی و اسهال

۴۶ - شکل بازی شیرخواران از کدام نوع است؟

- (د) گروهی (ج) مشارکتی (ب) موازی (الف) انفرادی

۴۷ - پرستار باید کدام یک از نکات زیر را در آموزش خانواده دارای کودک شش ساله دچار شب ادراری مدنظر قرار دهد؟

- (الف) شب ادراری، آشفتگی نیست بلکه یک رفتار ناخواسته است.
 (ب) بهبود خودبخودی شب ادراری تقریباً در ۳۵ درصد موارد اتفاق می‌افتد.
 (ج) ظرفیت عادی مثانه برای کودک شش ساله، ۶۰۰ سی سی است.
 (د) شب ادراری در درجه اول ناشی از اختلال در عملکرد عصبی- عضلانی مثانه است.

۴۸ - اقدام صحیح در موارد کنده شدن دندان دائمی کودک کدام است؟

- (الف) نگهداری دندان در بzac کودک یا والدین تا رسیدن به دندانپزشک

- (ب) محکم نگهداشتن دندان از ریشه تا رسیدن به دندانپزشک

- (ج) اسکراب کامل تاج و ریشه دندان کنده شده خاکی

- (د) به هیچ وجه، دندان کنده شده به جایش در دهان کودک برگردانده نشود



بهداشت مادران و نوزادان

۴۹ - کدام مورد از عوارض دیابت بارداری می‌باشد؟

- (الف) تأخیر رشد داخل رحمی نوزاد

تحصیلی ترین مرکز مشاوره، برنامه

ریزی و تضمین قبولی کارشناسی

۵۰ - افزایش حجم خون و کم خونی کاذب مربوط به کدام سه ماهه بارداری است؟

- (د) اول و سوم (ب) دوم (ج) سوم (الف) اول



۵۱ - کدام یک از موارد زیر در روند تغییرات فیزیولوژیک دوران نفاس صحیح است؟

- (الف) در هفته چهارم بعد از زایمان، سطح هماتوکریت به میزان قبل از بارداری باز می‌گردد.

- (ب) در ۲۴ ساعت اول بعد از زایمان درجه حرارت اندکی افزایش می‌یابد.

- (ج) هیدرونفروز ناشی از بارداری تا هفته ششم بعد از زایمان پایرچا می‌ماند.

- (د) دندانه‌دار شدن پوست شکم در خط وسط پس از زایمان بینگر دیاستاز شدید عضلات رکتوس در بارداری است.

Moshaveranetahsili.ir

۵۲ - کدام یک از تعاریف زیر در مورد میزان مرگ نوزادان صحیح است؟

- (الف) تعداد مرگ نوزاد به ازای هر ۱۰۰ تولد زنده در هنگام تولد تا ۱۲ ماه اول زندگی

- (ب) تعداد مرگ نوزاد به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده در هنگام تولد تا ۱۲ ماه اول زندگی

- (ج) تعداد مرگ نوزاد به ازای هر ۱۰۰ تولد زنده در هنگام تولد

- (د) تعداد مرگ نوزاد به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده در هنگام تولد

- (د) تعداد مرگ نوزاد به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده در هنگام تولد

۵۳ - کدام مورد زیر در ارزیابی انقباضات رحم در لیبر ضروری است؟

- (الف) انقباضات رحم با شدت متوسط

- (ب) کوتاه بودن فاصله انقباضات

- (ج) کم بودن قدرت انقباضات

- (د) انقباضات قوی

۵۴ - کدام مورد زیر در ارزیابی مرحله دوم زایمان ضروری است؟

- الف) ارزیابی علائم حیاتی هر ۲۰ دقیقه
- ب) ارزیابی و شنیدن صدای قلب جنین هر ۱۲۰ دقیقه
- ج) ارزیابی پایین آمدن جنین با معاینه واژینال هر ۱۵-۱۰ دقیقه
- د) کمک به مادران جهت استراحت در حین انقباضات

۵۵ - کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر اثرات فیزیولوژیک لیبر بر مادر می‌باشد؟

- الف) با هر انقباض رحم، فشار خون دیاستولیک ۱۵ میلی‌متر جیوه افزایش می‌یابد.
- ب) به دلیل افزایش میزان و عمق تنفس، میزان دفع نامحسوس آب در لیبر کاهش می‌یابد.
- ج) زمان تخلیه معده در نتیجه انقباضات رحمی کاهش می‌یابد.
- د) در نتیجه استرس در طول لیبر، سطح گلbul‌های سفید خون به شدت کاهش می‌یابد.

۵۶ - کدام مورد زیر از علل الیگوهیدرآمینوس می‌باشد؟

- الف) دیابت کنترل نشده مادر
- ب) انتقال خون قل به قل
- ج) حاملگی طول کشیده
- د) ناهنجاری روده‌ای جنین

۵۷ - خانم حامله‌ای در هنگام شروع لیبر، دچار **دفع خودبخود** مقدار اندکی موکوس آغشته به خون از واژن شده است، محتمل ترین علت آن چیست؟

- الف) تهدید به سقط
- تب) پارگی خفیف سرویکس
- ج) دکلمان، جفت نامه
- د) نمایش خونی (Bloody show)

۵۸ - کدام یک از موارد زیر در مورد تنفس نوزاد صحیح است؟

- الف) نوزادان عمده تنفس دهانی دارند.
- ب) رفلکس سرفه در نوزاد هنوز شکل نگرفته است.
- ج) تنفس نامنظم با دوره‌های کوتاه آپنه طبیعی است.
- د) تعداد تنفس نوزاد در دقایق اول زندگی ۲۰ عدد در دقیقه است.

۵۹ - در برسی معیار آپگار در نوزاد، کدام یک از پارامترهای زیر مورد برسی قرار می‌گیرد؟

- الف) فشارخون نوزاد
- ب) درجه حرارت نوزاد
- ج) میزان بروند ادراری
- د) رنگ پوست

۶۰ - در پس از زایمان، دور سر نوزاد ۳۵ سانتی‌متر است، این یافته نشانه چیست؟

- الف) اندازه دور سر طبیعی بوده و نرم‌وسفال است.
- ب) سر بزرگ است و احتمال هیدروسفالی وجود دارد.
- ج) سر کوچک است و احتمال میکروسفالی وجود دارد.
- د) این اندازه باید با یافته‌های جنینی قبل از زایمان مقایسه شود.

۶۱ - کدام تعریف پره اکلامپسی می‌باشد؟

- الف) افزایش فشارخون بارداری قبل از هفتاه ۲۰ بارداری
- ب) افزایش فشارخون تواًم با تشننج در بارداری
- ج) وجود افزایش فشارخون تا ۳ ماه بعد از زایمان
- د) افزایش فشارخون و پرتوثین ادرار بعد از هفتاه ۲۰ بارداری

۶۲ - کدام مورد زیر از علائم کنده شدن زودرس جفت است؟

- الف) خونریزی شدید بدون درد
- ب) انقباضات شدید رحمی با و یا بدون خونریزی
- ج) خونریزی روشن
- د) خونریزی تیره همراه با کاهش ضربان قلب و انقباضات نرمال

۶۳ - کدام موارد زیر نتیجه مسمومیت با تزریق سولفات منیزیم می‌باشد؟

- (الف) افزایش رفلکس پاتلار
- (ب) کاهش درجه حرارت بدن
- (ج) کاهش رفلکس و بی‌حالی
- (د) افزایش فشار خون و نبض

۶۴ - در کدامیک از موارد زیر مادر نایاب به نوزاد خود شیر بدهد؟

- (الف) مادر مبتلا به دیابت است.
- (ب) ابتلا به سل حتی اگر درمان شده باشد.
- (ج) مادرانی که به مواد مخدر معتاد هستند.
- (د) مادرانی که سابقه آلرژی قوی دارند.

۶۵ - کدامیک از جملات زیر در مورد تغییرات عالم حیاتی مادران بعد از زایمان درست است؟

- (الف) افزایش درجه حرارت بدن مادران تا ۲۴ ساعت بعد از زایمان نشانه عفونت می‌باشد.
- (ب) افزایش نبض در ساعت اولیه بعد از زایمان طبیعی است.
- (ج) تنفس مادران بعد از زایمان تا ۳ ساعت افزایش می‌یابد که طبیعی می‌باشد.
- (د) کاهش فشارخون بعد از زایمان طبیعی می‌باشد.

۶۶ - نخستین گام در درمان هماتوم‌های پرینه پس از زایمان کدام است؟

- (الف) تجویز داروهای آنالژیک و کمپرس آب گرم
- (ب) تجویز داروهای آنالژیک و کمپرس آب سرد
- (ج) تجویز آنتی‌بیوتیک و تخلیه هماتوم
- (د) تخلیه هماتوم و پک (pack) کردن ناحیه به مدت ۲۴ ساعت

۶۷ - در مراقبت از خانم باردار پیش از زایمان مشاهده می‌کنید که کیسه آب پاره شده و مایع سبز رنگی خارج شده است. این نشانه‌ها، کدام مشکل را نشان می‌دهد؟

- (الف) یافته طبیعی بوده و نشانه سیر طبیعی زایمان است.
- (ب) نشانه افزایش بیلروبین و عدم تطابق خونی مادر و جنین است.
- (ج) نشانه دفع مکونیوم از جنین و دیسترنس جنینی است.
- (د) نشانه خونریزی داخل رحمی و داخل کیسه آمنیوتیک است.

۶۸ - یکی از داروهایی که برای نوزادان نارس در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان استفاده می‌شود، سورفاکtant است.

کدامیک از موارد زیر از مراقبت‌های پرستاری هنگام استفاده از این دارو است؟

- (الف) دارو به صورت انفuzیون آهسته وریدی داده می‌شود.
- (ب) بعد از دادن دارو باید ریه‌های نوزاد ساکشن شود.
- (ج) حتماً نوزاد باید لوله تراشه داشته باشد.
- (د) پوزیشن نوزاد بعد از دادن دارو تغییر نکند.

۶۹ - کدامیک از عوامل زیر احتمال بروز نمایش بريچ را افزایش می‌دهد؟

- (الف) الیگوهیدرآمینوس
- (ب) هیدروسفالی
- (ج) نولی پارا
- (د) رحم دو شاخ

۷۰ - یکی از تشخیص‌های پرستاری در نوزادان پره‌ترم خطر عدم تعادل تغذیه کمتر از نیاز بدن است، برای کاهش این

مشکل چه مداخلاتی توصیه می‌شود؟

- (الف) کالری و پروتئین کمتر برای نوزادان در نظر گرفته شود.
- (ب) با دفعات بیشتر و حجم کمتر تغذیه شوند.
- (ج) باید تنها تحت تغذیه وریدی قرار گیرند.
- (د) تنها با شیر خشک تغذیه شوند.

۷۱ - کدام یک از موارد زیر اغلب یکی از اولین علائم بارداری است؟

- الف) حساسیت پستان
- ب) اریتم یا خارش کف دست
- ج) تهوع و استفراغ
- د) خستگی و افت فشارخون

۷۲ - در خصوص مصرف مدروكسی پروژسترون، کدام مورد درست است؟

- الف) احتمال کاهش وزن
- ب) توصیه به کاهش مصرف کلسیم
- ج) معاینه پستان، لگن، پاپ اسمیر
- د) برطرف شدن تدریجی بی‌حسی اندامها

بهداشت جامعه

۷۳ - «سازگاری با نیاز کودک جهت تخلیه انرژی» مربوط به کدام مرحله تکاملی خانواده است؟

- الف) تشکیل خانواده
- ب) خانواده با شیرخوار
- ج) خانواده با کودک پیش دبستانی
- د) خانواده با کودک در سن مدرسه

۷۴ - گزارش کدام حیطه‌ها در تفسیر ژنوتراکم مهم است؟

- الف) تاریخ ازدواج، طلاق، جدایی، ازدواج مجدد
- ب) ساختار خانواده، الگوهای تکراری، زیرسیستم خواهربرادری
- ج) پس زمینه اخلاقی و مذهبی اعضای خانواده، سطح تحصیلات
- د) شغل، مشکلات بهداشتی، دلیل مرگ

۷۵ - برای نیازسنجی یک خانواده دارای کودک مبتلا به سل، از کدام رویکرد نیازسنجی سلامتی استفاده می‌شود؟

- الف) رویکرد اپیدمیولوژی
- ب) رویکرد تطبیقی
- ج) رویکرد تلفیقی
- د) رویکرد مبتنی بر توانمندسازی

۷۶ - ویال‌های آماده شده کدام واکسن حداقل ۴ ساعت قابل استفاده است؟

- د) ثلاث
- ب) آبله مرغان
- الف) ب ث ژ
- ج) MMR

۷۷ - کدام گزینه در راستای پیشگیری زیر بنایی **primordial prevention** است؟

- الف) پرهیز از پدیدآمدن الگوهای موثر در افزایش خطر بیماری
- ب) تدارک اقداماتی برای افزایش پذیرندگی بیماری
- ج) متمرکز بر اشخاص پر مخاطره‌ی در معرض مواجهه‌های خاص
- د) پیشگیری از انتشار بیماری‌های مسری

۷۸ - اولین اصل کلیدی استراتژی مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) کدام است؟

- الف) مشارکت جامعه
- ب) عدالت در توزیع خدمات بهداشتی
- ج) هماهنگی بین بخشی
- د) تامین نیروی انسانی ماهر

۷۹ - پرستار سلامت جامعه در بازدید از منزل خانواده‌ای که فرزند آنها دچار سانحه شده است از والدین سوال می‌کند:

«چه چیزی بین شما و همسرتان بعد از این حادثه تغییر کرده است؟» رویکرد پرستار به خانواده کدام است؟

- (الف) Family as a context
 (ب) Family as a client
 (ج) Family as a component of Society
 (د) Family as a system

۸۰ - با توجه به ویژگی‌های بیماری رینود و عوامل خطر آن، این پدیده در کدام یک از گروه‌های زیر بیشتر مشاهده می‌شود؟

- (الف) در افرادی که در کارگاه‌های تاریک و نمور کار می‌کنند مانند: قالیباف‌ها.
 (ب) کارگرانی که به صورت شیفتی (نوبت کاری) و بیشتر در شب کار می‌کنند.
 (ج) در کسانی که در محیط‌های شلوغ و پرسر و صدا و بدون گوشی محافظت کار می‌کنند.
 (د) در کارگرانی که از ابزار و آلات موتور دستی مانند دریل استفاده می‌کنند.

۸۱ - مسمومیت با کدام یک از عوامل شیمیایی در محل کار می‌تواند منجر به بروز ناباروری در کارکنان شود؟

- (الف) مس (ب) روی (ج) سیلیس (د) منیزیوم

۸۲ - به دنبال بروز بارش شدید باران و آب گرفتگی و متعاقب آن سیل در یک منطقه روسستانی کوهستانی، پرستار مسئول مرکز بهداشت، مرتب منازل ناحیه را از نظر وجود حیوانات خطرناک مانند مار سمی مورد بازدید قرار داده و به روسستانیان اطلاع‌رسانی می‌کند. با توجه به مراحل مداخله در حوادث و بلاحا، فعالیت مذکور در کدام مرحله قرار می‌گیرد؟

- (الف) آمادگی تخصصی (ب) آمادگی فردی (ج) جبران (د) واکنش

۸۳ - کدام اقدام پرستار سلامت جامعه بر اساس اهداف برنامه «مردم سالم تا سال ۲۰۲۰» درخصوص کاهش نسبت کودکان و نوجوانان ۶-۲ سال چاق، مربوط به سطح سوم پیشگیری است؟

- (الف) آموزش به والدین برای انتخاب مواد غذایی سالم برای کودکان
 (ب) غربالگری کودکان و نوجوانان چاق با BMI مساوی یا بالاتر از ۳۰
 (ج) آنالیز منحنی قد و وزن کودکان به عنوان بخشی از بررسی و شناخت سالیانه
 (د) همکاری با مدارس برای بهبود کیفیت غذای تهیه شده در مدارس

۸۴ - کدام ویژگی اعضاء، باعث افزایش همبستگی و بهره‌وری گروه می‌شود؟

- (الف) تعارض بین اهداف گروهی
 (ب) ناهمگن بودن اعضای گروه
 (ج) جذابیت اهداف گروه برای رهبر
 (د) سازگاری اهداف فردی و گروهی

۸۵ - پرستار سلامت جامعه برای فردی که دچار گزش با سگ شده است به طور همزمان واکسن و ایمونوگلوبولین هاری تزریق می‌کند. به ترتیب کدام نوع ایمنی را تحریک می‌کند؟

- (الف) فعال ذاتی - غیرفعال اکتسابی
 (ب) فعال اکتسابی - فعال ذاتی
 (ج) غیرفعال اکتسابی - فعال اکتسابی
 (د) فعال اکتسابی - غیرفعال اکتسابی

۸۶ - چنانچه در یک لیتر آب ۹۰ میلی‌گرم کربنات کلسیم وجود داشته باشد، آن آب می‌باشد.

- (الف) سبك (ب) نسبتاً سخت (ج) متوسط (د) سخت

۸۷ - کدام جمله در مورد واکسن صحیح می‌باشد؟

- الف) DTP حساس‌ترین واکسن در مقابل نور است.
- ب) OPV حساس‌ترین واکسن در مقابل حرارت است.
- ج) ماهیت واکسن BCG باکتری کشته شده است.
- د) ماهیت واکسن IPV ویروس زنده‌ی ضعیف شده است.

۸۸ - نوبت سوم واکسن فلچ اطفال خوراکی در چند ماهگی تجویز می‌شود؟

- د) هجده
- ج) شش
- ب) چهار
- الف) دو

۸۹ - در اولین مراجعه کودکی ۹ ساله بدون سابقه ایمن‌سازی به مرکز سلامت چه واکسن‌هایی باید تزریق شود؟

- BCG, OPV, IPV, Hep B
- BCG, OPV, DT, Hep B
- DT, BCG, IPV, Hep B
- DT, OPV, IPV, Hep B

۹۰ - عبارت «تدارک خدمات بهداشتی ادغام یافته‌ی پیگیری، درمانی و ارتقایی از «پیش از گهواره تا گور» برای همه

ساکنین یک جامعه معین» می‌بین کدام روش ارائه مراقبت بهداشتی است؟

- (الف) مراقبت بهداشتی جامع (Comprehensive Health Care)
- (ب) خدمات بهداشتی اساسی (Basic Health Services)
- (ج) مراقبت‌های بهداشتی اولیه (Primary Health Care)
- (د) برنامه‌ریزی بهداشتی (Health Planning)

۹۱ - پرستار سلامت جامعه قصد استفاده از مدل «اعتقاد بهداشتی» جهت مشارکت پرستاران در استفاده از وسائل محافظت

فردي در اپیدمی COVID-19 را دارد. کدام گزینه به عنوان Perceived Susceptibility می‌تواند مطرح باشد؟

- الف) دسترسی به دانش روز
- ب) احتمال بالای ابتلاء به بیماری
- ج) دسترسی به وسائل محافظت فردی
- د) آگاهی از روش استفاده

۹۲ - تعریف «درجه‌ای که فرد می‌تواند اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه را تحصیل، پردازش و درک کند تا امکان

تصمیم‌گیری بهداشتی مناسبی را داشته باشد» نشان دهنده‌ی چه مفهومی می‌باشد؟

- (د) Social Ability
- (ج) Decision Making
- (ب) Health Equality
- (الف) Health Literacy

۹۳ - برای بررسی نقش محیط در رشد و نمو کودکان کدام ابزار کارایی بیشتری دارد؟

- Eco map
- HOME
- Genogram
- APGAR
- الف) Eco map
- ب) HOME
- ج) Genogram
- الف) APGAR

۹۴ - برای مدیریت فاضلاب یک شهر بزرگ کدام روش توصیه می‌شود؟

- (الف) تصفیه زیستی با لجن فعال
- (ب) پالایش قطره‌ای
- (ج) تصفیه شیمیایی
- (د) استفاده از سپتیک تانک

۹۵ - راهبرد DOTS برای مبارزه با کدام بیماری به کار می‌رود؟

- د) سیاه سرفه
- ب) کزان
- ج) سل
- الف) سرخ

۹۶ - در یک مرکز بهداشت، پرستار مسئول آموزش مادران در مورد اثرات آلوگی هوا، آموزش می‌دهد، کدام‌یک از موارد زیر از جمله خطرات بالقوه‌ای است که پرستار در مورد اثرات آن بر سلامتی کودکان تاکید بیشتری می‌کند؟

- (الف) ابتلا به انواع بیماری‌های قارچی و همچنین سیاه زخم
- (ب) اختلال در یادگیری و رشد ذهنی و به دنبال آن مشکلات ذهنی کودکان
- (ج) مشکلات بینایی مانند گلوکوم و انواع اختلالات عدسی چشم
- (د) مسمومیت با فلزات سنگین و کادمیوم و سرب

روان‌پرستاری

۹۷ - کدام یک در مورد استرس صحیح است؟

- (الف) از نظر زیست‌شنختی، پاسخ اصلی استرس را انطباق (سازش) می‌نامند.
- (ب) افراد تحت فشارهای متفاوت قرار دارند، اما استرس و پاسخ به آن فردی است.
- (ج) افراد تحت فشارهای یکسان، عکس العمل مشابهی نشان می‌دهند.
- (د) هموستان برای جبران ترجیح اپی‌نفرین - نوراپی‌نفرین، نشانه عدم سازگاری با استرس است.

۹۸ - هنگام مراقبت از بیمار ۸۷ ساله، پرستار باید در کدام یک از موارد زیر مستقیماً روی مفهوم از خود بیمار تاثیر دارد؟

مشاوران تحصیلی

(الف) نگرش و رفتار وابستگان ارائه‌کننده مراقبت

(ب) رفتارهای مراقبتی پرستار و تیم مراقبت بهداشتی

(ج) سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی

(د) تطابق با تغییر نقش، از دست دادن عزیز و ارزشی جسمی

۹۹ - فردی پس از شکست در کنکور دچار اختلال افسردگی اساسی می‌شود، شکست در کنکور به عنوان عامل است.

- (الف) زمینه ساز
- (ب) آشکار کننده
- (ج) تداوم دهنده
- (د) مساعد کننده

۱۰۰ - طبق راهنمای تشخیصی و آماری ویرایش پنجم -DSM5- کدام یک از اختلالات زیر از طبقه اختلالات اضطرابی خارج شده است؟

(الف) اختلال اضطراب منشر (Generalized Anxiety Disorder)

(ب) اختلال هراس (Panic Disorder)

(ج) اختلال وسواسی- جبری (Obsessive-Compulsive Disorder)

(د) فوبیا (Phobia)

Moshaveshaveranetahsili.ir

۱۰۱ - کدام‌یک از اظهارات پرستار در رابطه با بیمار افسرده نشان دهنده تفکر کلیشه‌ای، بی‌تجربگی و مانعی برای ارتباط است؟

(الف) اختلال خلقی فراتر از کنترل بیمار جهت تغییر می‌باشد و با ناراحتی معمول متفاوت است.

(ب) بیماران گاهی از خلقی صحبت می‌کنند که با عاطفه آشکار آنها ناسازگار است.

(ج) بیماران با داشتن تفکر مثبت و مشغول زندگی شدن فرصتی برای افسرده شدن نخواهند داشت.

(د) درگیر شدن با تعاملات اجتماعی کمک کننده است.

۱۰۲ - استراتژی درمان اختلالات شخصیت، ترکیبی از می‌باشد.

(الف) شناخت درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی

(ب) فرد درمانی، گروه درمانی و دارو درمانی

(ج) آموزش مهارت‌های اجتماعی، گروه درمانی و شناخت درمانی

(د) افزایش اعتماد به نفس، آموزش مهارت‌های اجتماعی و فرد درمانی

۱۰۳ - در هنگام برقراری ارتباط با بیماری که از پذیرش اقدامات مراقبتی شما امتناع می‌کند، بیان کدامیک از عبارات زیر مناسب است؟

- الف) مشکلت چیه؟ مایلی پرستار دیگری از شما مراقبت کنه؟
- ب) من می‌خواهم به شما کمک کنم. چه کاری می‌توانم بکنم؟
- ج) میدونی اینها دستور پزشکه و اگر انجام نشه خیلی بد میشه؟
- د) چرا منو دوست نداری؟ چرا تو کار من ایجاد اختلال می‌کنی؟

۱۰۴ - مداخلات پرستاری در بیمار دچار استرس پس از سانحه PTSD شامل کدام مورد می‌باشد؟

- الف) ارتقای وضعیت تغذیه، کمک به بهبود وضعیت خواب و کمک به کاهش اضطراب
- ب) کاهش اضطراب، کمک به افزایش اعتماد بنفس، ارتقای امنیت مددجو و بهبود وضعیت خواب
- ج) کمک به مددجو جهت مقابله با استرس و هیجانات، کاهش اضطراب و بهبود وضعیت خواب
- د) کمک به افزایش اعتماد به نفس، ارتقای امنیت مددجو و کمک به مددجو جهت مقابله با استرس و هیجانات

۱۰۵ - تخریب عملکرد در آگاهی، درک محیط، هویت و حافظه در دیده می‌شود.

- الف) اختلال تبدیلی
- ب) اختلال تجزیه‌ای
- ج) اختلال خلقی
- د) اختلال افسردگی

۱۰۶ - کدام مورد، بر روی مرحله برسی و شناخت فرایند پرستاری در هنگام مصاحبه با بیمار روانی تاثیر بیشتری می‌گذارد؟

- الف) وضعیت شناختی و بصیرت بیمار
- ب) وضعیت خلقی و عاطفی بیمار
- ج) وضعیت هوشی و هیجانی بیمار
- د) وضعیت توجه و تمرکز بیمار

تحصیلی و تضمین قبولی کارشناسی

۱۰۷ - تعریف گروه خودیار (self-help group) کدام است؟

- الف) اعضای گروهی که بیماری مشترک داشته‌اند، و با هدایت درمانگر به همدیگر کمک می‌کنند.
- ب) اعضای گروه غیر رسمی هستند که تجربیات مشترک خود را مبادله و به هم کمک می‌کنند.
- ج) اعضای یک گروه رسمی که درد و هدف مشترک داشته و به همدیگر کمک می‌کنند.
- د) اعضای گروه دارای مشکل و علائم مشترک که توسط درمانگر به آنها کمک می‌شود.

۱۰۸ - داروهای آنتی‌سایکوتیک معمولاً با اثر خود را می‌گذارند.

- الف) مهار دوپامین
- ب) مهار سروتونین
- ج) افزایش دوپامین
- د) افزایش دوپامین و سروتونین

۱۰۹ - کدامیک از علائم زیر جزء عوارض اکسترا پیرامیدال داروهای آنتی‌سایکوتیک می‌باشد؟

- الف) یبوست
- ب) تاری دید
- ج) احتباس ادراری
- د) اکاتزیا

۱۱۰ - در اختلال دوقطبی نوع یک، کدامیک از حالات زیر وجود دارد؟

- الف) حالات افسردگی و مانیا بطور متناوب
- ب) حالت مانیا با حداقل یک دوره افسردگی
- ج) حالت افسردگی حداقل با یک دوره مانیا
- د) حالت افسردگی و مانیا بطور ثابت

۱۱۱ - اولین نکته در مراقبت از کودکان دچار سوء استفاده Child Abuse است.

- الف) بررسی و مصاحبه با والدین جهت تشخیص
- ب) بررسی وضعیت روانی اجتماعی کودک
- ج) مصاحبه با خود کودک بدون حضور والدین
- د) تامین امنیت و رفاه کودک

- ۱۱۲ - تئوری پیاژه بر رشد و تکامل متمرکز است.
- (الف) شناختی
 (ب) روانی
 (ج) اجتماعی
 (د) جنسی

- ۱۱۳ - کدامیک از درمان‌های غیر دارویی زیر در بیماران اسکیزوفرنیک متداول‌تر استفاده می‌شود؟
- (الف) شناخت درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی فردی
 (ب) رفتار درمانی، روان درمانی گروهی، شناخت درمانی
 (ج) روان درمانی فردی، روان درمانی گروهی، خانواده درمانی
 (د) آموزش مهارت‌های اجتماعی، رفتار درمانی، گروه درمانی

- ۱۱۴ - نرو ترانسمیتر (میانجی عصبی) گابا (GABA) در کدامیک از اختلالات موثر است؟
- (الف) اختلال افسردگی
 (ب) اختلال اضطرابی
 (ج) اختلال اسکیزوفرنیا
 (د) اختلال شخصیت

- ۱۱۵ - میوزیس، کاهش سطح هوشیاری و دپرسیون تنفسی در مسمومیت با کدامیک از مواد مخدر زیر دیده می‌شود؟
- (الف) ترکیبات تریاک
 (ب) ترکیبات آمفتابینی
 (ج) الکل و مشتقان آن
 (د) حشیش و مشتقان آن



- ۱۱۶ - افکار و هذیان بزرگ منشی در دیده می‌شود.
- (الف) مانیا، اختلال شخصیت خودشیفته، اسکیزوفرنی پارانویید
 (ب) اختلال شخصیت خودشیفته، افسردگی، وسوس
 (ج) وسوس، شخصیت ضد اجتماعی، اسکیزوفرنی پارانویید
 (د) مانیا، شخصیت ضد اجتماعی، وسوس

- ۱۱۷ - پسر جوان کوتاه قدمی که در **حین مصاحبه، پس از شبکایت از راه نیافتن به** تیم بسکتبال مدرسه، می‌گوید «این مشکلی نیست زیرا من دانش‌آموز رتبه دوم و مورد تشویق مسئولین مدرسه هستم»، کدام مکانیسم دفاعی را استفاده نموده است؟



- (الف) انکار (Denial)
 (ب) انتقال (Transference)
 (ج) به‌گرایی (Sublimation)
 (د) جبران (Compensation)

- ۱۱۸ - مداخلات پرستاری موثر در اختلال وسوس و اجبار کدام است؟



- (الف) ارتباط‌درمانی، رفتار‌درمانی، دارو‌درمانی
 (ب) رفتار‌درمانی، ریلاکسیشن‌ترایپی، آموزش مددجو و خانواده
 (ج) شناخت‌درمانی، رفتار‌درمانی، دارو‌درمانی
 (د) ارتباط‌درمانی، شناخت‌درمانی، آموزش مددجو و خانواده

- ۱۱۹ - وابستگی بیش از حد به دیگران در برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های جدی و سخت جسمی، از نشانه‌های استفاده از کدام مکانیسم دفاعی است؟

- (الف) بازگشت
 (ب) جبران
 (ج) والایش
 (د) جابه‌جایی

- ۱۲۰ - خانواده‌درمانی شکلی از می‌باشد.

- (الف) گروه‌درمانی است که اعضای خانواده به صورت گروهی با هم درمان می‌شوند.
 (ب) گروه‌درمانی است که همه اعضای خانواده به صورت تک به تک درمان می‌شوند.
 (ج) روان‌درمانی است که همه اعضای خانواده در جلسات شرکت، ولی فرد بیمار فقط درمان می‌شود.
 (د) روان‌درمانی است که همه اعضای خانواده در درمان بیمار مشارکت می‌کنند.

Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions.

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

It seems unlikely to achieve the dream that some clinicians had in the middle of the 20th century about the future eradication of most common infectious diseases from humanity. Recent experience with the emergence of totally new infectious diseases (AIDS, SARS, etc.), and the epidemiological trends of antibiotics resistance, indicate that we will continue to move in the opposite direction, towards an environment with an ever growing number of new infectious diseases and of more common bacteria which develop resistance to antibiotic, and of bacteria which continue to migrate from the hospital setting to the community. The result could be even higher morbidity, higher mortality, higher costs, and the potential for the rapid spread of these bacteria, and overall a decreasing number of useful antimicrobial agents to combat the infections they cause.

It is important to gain a good understanding of the molecular basis for the development of resistance because it allows us to develop new approaches to manage the infections caused by these bacteria and to create new strategies for the development of new treatments against these bacteria.

121 – The first paragraph is mainly about the infectious diseases.

- a) insufficiency of efforts to defeat
- b) efficacy of steps followed against
- c) ease of removing
- d) existing epidemiology of

122 – The text to defeat the infectious diseases.

- a) opposes recent methods
- b) provides a definite solution
- c) is doubtful about future attempts
- d) considers ongoing new efforts

123 – The appearance of new infectious diseases indicates potential risks caused by

- a) microorganism resistance against antibiotics
- b) human coexistence with antibiotics
- c) infections initiated by antimicrobial agents
- d) inactive bacteria and microorganisms in hospitals

124 – The writer is the eradication of the common infectious diseases.

- a) optimistic about
- b) indifferent to
- c) biased toward
- d) uncertain about

125 – The underlined phrase opposite direction refers to all of the following, EXCEPT the

- a) enhancement in the emergence of new infections
- b) development of antibiotic resistance
- c) understanding infectious agents entirely
- d) failure in fully eradicating infectious diseases

Passage 2

One of the biggest challenges for hospitals today is the availability of a strong, capable, and motivated workforce. Hospitals are 'people-driven' and their primary expenses are labor costs. As in many developed and developing countries, many hospitals in Middle Eastern countries have come to realize that the most important asset to their organization, besides physical capital and consumables, is their health human resources, without which they cannot properly function. At the system level, evidence indicates a strong link between the availability of healthcare providers and population health outcomes. Poor work environments and the absence of sound recruitment and retention practices are some of the key health human resources challenges that are facing many Middle Eastern hospitals. These obstacles have resulted in growing staff shortages, attrition and early retirement, poor staff satisfaction, high turnover, and emigration. These are the consequences of poor managerial and planning capacity in the area of health human resources, and lack of recruitment and retention strategies.

Moshaveranetahsili.ir

126 – The employment of skilled and enthusiastic personnel

- a) is a challenge in developed and developing countries
- b) has already been resolved in developed countries
- c) is limited to the Middle Eastern countries
- d) has limited financial costs

127 – According to the passage,

- a) lots of people are encouraged to work in hospitals
- b) people are regarded as the great challenges for hospitals
- c) the hospital costs are mainly devoted to the personnel
- d) there is an abundance of motivated workforce in hospitals

128 – Hospitals in many countries, like the Middle Eastern countries

- a) are not significant assets to their countries
- b) fail to work properly without their physical asset
- c) have linked health care providers to people
- d) consider human resources as a major asset

129 – Inefficient work places and the lack of strong employment practices are in the Middle Eastern hospitals.

- a) considered as barriers
- b) set as missions in the
- c) no longer observed
- d) intentionally underestimated

130 – Some medical staff may leave their hospitals and go abroad due to the

- a) great benefits of early retirement
- b) poor retention strategies
- c) growing number of personnel
- d) presence of poor personnel

moshaveshaveranetahsili.ir

Passage 3

Pain can be categorized according to several variables, including its duration (acute, convalescent, chronic), its pathophysiologic mechanisms (physiologic, nociceptive, neuropathic), and its clinical context (e.g., postsurgical, malignancy related, neuropathic, degenerative). Acute pain follows traumatic tissue injuries and is generally limited in duration, and is associated with temporal reductions in intensity. Acute pain might be mild and last just a moment, or it might be severe and last for weeks or months. Unlike chronic pain, acute pain does not last longer than six months, and it disappears when the underlying cause of pain has been treated or has healed. Chronic pain may be defined as discomfort persisting 3-6 months beyond the expected period of healing. In some chronic pain conditions, symptomatology, underlying disease status, and other factors may be of greater clinical importance than definitions based on the duration of discomfort.

Moshaveranetahsili.ir

131 – Categorization of pain is based on all of the following factors, EXCEPT the

- a) pathophysiology that pain follows
- b) traumatic tissue injury that pain causes
- c) length of time that pain takes
- d) clinical circumstances under which pain appears

مشاوران تخصصی

132 – Acute pain

تخصصی ترین مرکز مشاوره، برنامه

- a) continues even after the cause of pain is removed
- b) gets more and more intense over time
- c) continues in most cases of discomfort
- d) is hardly a long lasting symptom

ریزی و تضمین قبولی و مدد

ارشد وزارت بهداشت

133 – Chronic pain is

مشاوران تخصصی

- a) severe or mild based on the duration of its symptoms
- b) a subcategory of pain based on its clinical context
- c) a discomfort that rarely heals in the expected period
- d) limited in duration and comes after serious injuries

134 – What is the best topic for this paragraph?

Moshaveranetahsili.ir

- a) Classification of chronic pain
- b) Etiology of acute pain
- c) Common features of acute pain
- d) Acute pain versus chronic pain

135 – It is stated that sometimes definitions rooted in the length of pain for chronic discomforts are the underlying disease status.

- a) more important than
- b) of less significance compared to
- c) reportedly comparable to
- d) originally rooted in

Passage 4

It is recognized that for people to be motivated to use health knowledge, it must be presented to them in a comprehensible and acceptable manner. Their basic emotional needs and wants; their cultural attitudes; beliefs and prejudices; their fears, ambitions, jealousies, determinations, pride and malice; or any combination of these must all be taken into consideration. Rosenstock and colleagues summarized the problem well: "It is known that human behavior is determined more by one's belief about reality than by reality itself. People vary markedly in their interpretations of reality." As a consequence, it has been pointed out that effective health education can be achieved only by linking what is taught to the **endogenous** motivation of the individual or group addressed.

136 – The writer considers as a requirement for the people to implement their knowledge about health.

- a) susceptibility
- b) comprehensibility
- c) comparability
- d) sustainability



مشاوران تخصصی

137 – Attention to is viewed as the requirement for the proper application of health knowledge by people.

- a) cultures, feelings and attitudes
- b) unique experience
- c) educational background
- d) all lifestyle differences

تخصصی تربین مرکز مشاوره، برنامه

ریزی و تضمین قبولی کارشناسی

ارشد وزارت بهداشت

138 – Some scholars believe that the major determinant of peoples' behavior is

- a) their interpretation of reality
- b) the implementation of reality
- c) the true sense of reality
- d) their health education

Moshaveranetahsili.ir

139 – The underlined word **endogenous** in the last sentence is closest in meaning to

- a) external
- b) inhibited
- c) internal
- d) determined

140 – The passage concludes that

- a) health education has failed to be used by people in the society
- b) health education is useful if it is associated with people's motivation
- c) peoples' combinations or groups must be taken into consideration
- d) human behavior has nothing to do with the existing reality

Part two: Vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

141 – Recent medical advances have caused a drop in mortality rates among children, with a limited number of deaths.

- a) limited b) radical c) trivial d) slight

142 – Once an infection , older adults experience more disease and death than younger individuals.

- a) occurs b) repairs c) subsides d) expires

143 – If you want to stay mentally sharp and physically healthy, it is good to a diet that is balanced in terms of its fat.

- a) prevent b) avoid c) object to d) commit to

144 – The researchers cut the calories the subjects used to take in by half to examine the effect of food on their metabolism.

- a) deprivation b) confrontation c) contamination d) supplementation

145 – Cognitive behavior therapy offers certain techniques which parents can use to their children's unwanted behaviors.

- a) aggregate b) constrain c) advocate d) instigate

146 – Unreliable health information on social media will distract public from first-hand scientific health reports.

- a) bias b) decline c) attention d) discomfort

147 – All the information clients provide to counsellors is normally kept hidden from other people and treated as strictly

- a) confidential b) reciprocal c) provisional d) longitudinal

148 – By following an effective smoking plan, smokers can stop smoking sooner.

- a) circulation b) adaptation c) compulsion d) cessation

149 – An effective treatment to the Covid-19 infection can be achieved only through a strict the dosage of drugs prescribed by the doctor.

- a) adherence to b) alteration of c) fluctuation of d) conversion to

150 – A top health authority said that a factor contributing to the patient pile-up during the pandemic peak was the staff

- a) participation b) shortfall c) abundance d) assistance

151- Researchers attributed the of the disease to the appearance of some new fatal genes.

- a) incompetence
- b) ineffectiveness
- c) severity
- d) harmlessness

152- Seizures are accompanied by lack of consciousness with occasional movements that are out of patient control.

- a) involuntary
- b) invaluable
- c) organized
- d) systematic

153- A recent study shows that in some societies people mistakenly consider left-handers and clumsy.

- a) bilateral
- b) awkward
- c) superb
- d) flawless

154- He his own position after giving a successful lecture well appreciated by the personnel.

- a) condensed
- b) condemned
- c) concealed
- d) consolidated

155- A scientific theory will not continue for a long time if its assumptions are not by facts.

- a) spoiled
- b) opposed
- c) approved
- d) contradicted

156- Health information technology is by the use of new and advanced technology in health care domain.

- a) abandoned
- b) characterized
- c) impaired
- d) exacerbated

157- The doctor believed that the patient should be hospitalized if the respiratory symptoms

- a) declined
- b) terminated
- c) persisted
- d) subsided

158- Under the Corona virus condition, people with fever are more likely to refer to a hospital to the reason.

- a) inspect
- b) ingest
- c) sustain
- d) prolong

159- Injection and inhalation are two different ways of drug

- a) contamination
- b) dispersion
- c) interaction
- d) administration

160- One important nursing procedure is the vital signs which is normally performed after physical examination.

- a) assessment
- b) avoidance
- c) underestimation
- d) cessation